



ESPECIFICAÇÕES

BULA VACINA VIVA REOVAC INATA:
BULA EM PAPEL SULFITE 70G, 1X1 COR
(PRETO), MEDINDO 100MM x 115MM





LEIA COM ATENÇÃO

REOVAC INATA®

Vacina viva liofilizada contra Reovirose Aviária contendo cepa S1133.



USO VETERINÁRIO

1.000, 2.000, 5.000 doses

INDICAÇÃO

REOVAC INATA® é indicada para a proteção contra a Reovirose Aviária de galinhas reprodutoras, poedeiras comerciais e frangos de corte. Possui em sua composição a cepa S1133, cultivada em cultura celular de fibroblasto de embrião de galinhas SPF (Specific Pathogen Free).

COMPOSIÇÃO

Cada dose do produto contém suspensão de Reovírus Aviário cepa S1133 com título mínimo na data da liberação de $10^{2.7}$ DICT₅₀ e título mínimo na data do vencimento de $10^{2.0}$ DICT₅₀.

APRESENTAÇÃO

O produto é apresentado em frascos contendo 1.000, 2.000 ou 5.000 doses, acondicionados em cartuchos com 10 frascos, acompanhados de bula. Os diluentes para vacinação ocular não acompanham o produto, sendo fornecidos sob solicitação.

VALIDADE

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação.

DOSAGEM

A dosagem é 1 dose/ave por via ocular.

MODE DE USAR

Administração via ocular:

- Indicada para vacinação de aves a partir de 7 dias de idade.
- Ressuspender a vacina no Diluente para vacinação ocular INATA®, na proporção de 1 frasco de 1.000 doses para cada 30 mL de diluente (0,03 mL/ave).
- Agitar a suspensão até a sua completa dissolução.
- Transferir pequenas quantidades da suspensão para o frasco conta-gotas e proceder com a administração ocular.
- Manter a suspensão refrigerada durante todo o procedimento.





PRECAUÇÕES

- 1.Temperatura de estocagem: o produto deverá ser estocado em temperatura entre 2°C e 8°C para que sejam preservadas as suas características durante todo o período de validade.
- 2.Ésta vacina é constituída de vírus vivo e fechada à vácuo. Portanto, recomenda-se utilizar a vacina em até 90 minutos após ressuspensida, de modo a evitar a perda da capacidade imunogênica da mesma.
- 3.Após reconstituição e vacinação, qualquer sobra deve ser devidamente descartada.
- 4.Não vacinar aves nos 21 dias que antecedem o abate.
- 5.Não utilizar esta vacina 12 semanas antes de começar a postura e durante o período de produção das reprodutoras.
- 6.Não vacinar aves doentes ou desnutridas.
- 7.Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- 8.Descartar os frascos de vacinas utilizados conforme instruções regulamentares vigentes.
- 9.Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante desta vacina, visto que todas as provas de controle de qualidade foram realizadas com diluente próprio.
- 10.Mantenha um registro das vacinas e diluentes utilizados.

CONTRAINDICAÇÕES

Não há contraindicações se a vacina for administrada de acordo com as instruções de uso.

Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C e ao abrigo da luz solar direta. Não congelar.

VENDA FRACIONADA PROIBIDA

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.378/2021 em 19/01/2021.
Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco - CRMV-MG nº 19.770



PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

