

LEIA COM ATENÇÃO

ADENOVÍRUS® ATV

Vacina inativada contra Aviadenovírus (sorovares 1, 5, 8, 10 e 11)
e Astrovírus aviário (cepa CAstV).



USO VETERINÁRIO

Contém 500ml
1.000 doses**INDICAÇÕES:**

ADENOVÍRUS ATV® é indicada para vacinação de matrizes leves e pesadas da espécie Gallus gallus domesticus contra os agentes Aviadenovírus aviário e Astrovírus aviário.

FÓRMULA:

Cada dose de 0,5 mL da vacina contém, no mínimo:

Adenovírus I sv*1 (FAdV** sv1).....	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Adenovírus I sv5 (FAdV sv5).....	10 ^{7,0} DIE ₅₀
Adenovírus I sv8 (FAdV sv8).....	500 UHA
Adenovírus I sv10 (FAdV sv10).....	10 ^{8,0} UFC
Adenovírus I sv11 (FAdV sv11).....	10 ^{8,0} UFC
Astrovírus (CAstV***).....	10 ^{8,0} UFC
Emulsão excipiente q.s.p.....	0,5ml

*Sorovar

**Fowl adenovirus

***Chicken astrovirus

MODO DE USAR:

AGITAR VIGOROSAMENTE ANTES DE USAR.

A dose indicada por aplicação é de 0,5 mL/animal. Administrar pela via intramuscular no peito.

Recomenda-se o esquema de vacinação em duas doses de 0,5 mL cada, sendo a primeira aplicada em aves a partir de 8 semanas para matrizes leves e 12 semanas para matrizes pesadas e a segunda 6 semanas após a primeira dose. Ou conforme recomendações do médico veterinário.

PRECAUÇÕES:

1. Permitir que o produto atinja temperatura entre 15°C e 25°C para a sua aplicação.
2. Agitar bem antes e durante a vacinação.
3. Vacinar somente aves saudáveis.
4. Utilizar agulhas, seringas e equipamentos estéreis.
5. Após o término da vacinação, eliminar corretamente frascos e sobras de vacina.

ADVERTÊNCIAS:

1. Em caso de autoaplicação acidental, poderá haver uma reação local, que em alguns casos pode ser grave. Neste caso, aconselha-se buscar atendimento médico, levando consigo a embalagem do produto.
2. Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
3. A eficácia do produto é garantida quando administrado de acordo com as recomendações do fabricante e não causa reações adversas. Entretanto, reações individuais de hipersensibilidade podem eventualmente ocorrer, nestes casos indica-se o tratamento sintomático.

Conservar em temperatura entre 2° C e 8° C e ao abrigo da luz solar direta. Não congelar. Após aberto, o conteúdo do frasco deverá ser completamente utilizado.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.569/2023 em 10/10/2023 Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

READ CAREFULLY

ADENOVÍRUS® ATV

Vacuna inactivada contra Aviadenovirus (serotipos 1, 5, 8, 10 y 11)
y Astrovirus aviar (cepa CAstV).



Content 500mL
1.000 doses

INDICATIONS:

ADENOVIRUS ATV® is indicated for vaccination of lightweight and heavy breeder hens from the Gallus gallus domesticus species against the agents avian Adenovirus and avian Astrovirus.

FORMULA:

Each dose of vaccine contains, as a minimum:

Adenovirus I sv*1 (FAdV** sv1).....	10 ^{8.0} DIE ₅₀
Adenovirus I sv5 (FAdV sv5).....	10 ^{7.0} DIE ₅₀
Adenovirus I sv8 (FAdV sv8).....	500 UHA
Adenovirus I sv10 (FAdV sv10).....	10 ^{8.0} UFC
Adenovirus I sv11 (FAdV sv11).....	10 ^{8.0} UFC
Astrovirus (CAstV***).....	10 ^{8.0} UFC
Excipient emulsion q.s.p.....	0,5ml

*Sorovar

**Fowl adenovirus

***Chicken astrovirus

HOW TO USE:

SHAKE VIGOROUSLY BEFORE USING.

The indicated dose per application is 0.5 mL/animal. Administer via intramuscular route on chest.

The recommended vaccination scheme is of two doses of 0.5 mL each, with the first being applied to fowls as of 8 weeks of age for lightweight hens and 12 weeks for heavy hens, and the second dose applied 6 weeks after the first dose. Or according to recommendations from the veterinarian.

PRECAUTIONS:

1. Allow the product to reach a temperature between 15°C and 25°C for its application.
2. Shake vigorously before and during the vaccination.
3. Vaccinate only healthy birds.
4. Use sterile needle, syringes and equipment.
5. After the vaccination ends, discard correctly the vials and vaccine leftovers.

WARNINGS:

1. In case of accidental self-application, there may be a local reaction, which may be severe in some cases. In this case, it is advisable to seek medical assistance, bringing along the product package.
2. Keep the product away from children and pets.
3. The product efficacy is guaranteed when administered according to recommendations from the manufacturer and it does not cause adverse reactions. However, individual hyper-sensitivity reactions may eventually occur; in such cases, the symptomatic treatment is indicated.

Keep at temperature between 2°C and 8°C and protected from direct sunlight. Do not freeze.

Licensed with the Ministry of Agriculture with the number 10.569/2023 on 10/10/2023 Technical Manager: José Renato de Oliveira Branco – CRMV - MG 19.770

OWNER AND MANUFACTURER:

Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

LEER ATENTAMENTE

ADENOVÍRUS® ATV

Inactivated vaccine against avian Adenovirus (serovars 1, 5, 8, 10 and 11)
and avian Astrovirus (CAstV strain).



USO VETERINARIO

Contenido 500mL
1.000 dosis**INDICACIONES:**

ADENOVIRUS ATV® se indica para la vacunación de reproductoras livianas y pesadas de la especie Gallus gallus domesticus contra los agentes Adenovirus aviar y Astrovirus aviar.

FÓRMULA:

Cada dosis de vacuna contiene, como mínimo:

Adenovirus I sv*1 (FAdV** sv1).....	10 ^{8,0} DIE ₅₀
Adenovirus I sv5 (FAdV sv5).....	10 ^{7,0} DIE ₅₀
Adenovirus I sv8 (FAdV sv8).....	500 UHA
Adenovirus I sv10 (FAdV sv10).....	10 ^{8,0} UFC
Adenovirus I sv11 (FAdV sv11).....	10 ^{8,0} UFC
Astrovirus (CAstV***).....	10 ^{8,0} UFC
Emulsión excipiente q.s.p.....	0,5ml

*Sorovar

**Fowl adenovirus

***Chicken astrovirus

MODO DE USAR:

AGITAR VIGOROSAMENTE ANTES DE USAR.

La dosis indicada por aplicación es de 0,5 mL por animal. Administrar por vía intramuscular en el pecho.

Se recomienda el esquema de vacunación en dos dosis de 0,5 mL cada una; la primera se aplica en aves a partir de 8 semanas para reproductoras livianas y 12 semanas para reproductoras pesadas; la segunda dosis se aplica 6 semanas después de la primera dosis. O conforme recomendaciones del médico veterinario.

PRECAUCIONES:

1. Permitir que el producto alcance una temperatura de entre 15°C y 25°C para su aplicación.
2. Agitar bien antes y durante la vacunación.
3. Vacunar únicamente aves saludables.
4. Utilizar agujas, jeringas y equipos estériles.
5. Después de finalizar la vacunación, elimine correctamente frascos y sobras de vacuna.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales.

ADVERTENCIAS:

1. Si el operador se aplica la vacuna a sí mismo (en la mano, por ejemplo), puede haber una reacción local que en algunos casos puede ser grave. Ante este tipo de accidente, se aconseja encaminar a la atención médica e informar que el producto contiene aceite mineral en su composición.
2. A pesar de que cada partida se libera después de ser probada en aves sensibles de bioterio, el producto puede provocar, en algunos individuos, pequeñas reacciones locales de inflamación, como rubor y edema hasta dos semanas después de la vacunación.

Conservar a una temperatura de entre 2°C y 8°C, y al abrigo de la luz solar directa. No congelar.

Certificado en el Ministerio de Agricultura con el n° 10.569/2023 el 10/10/2023 Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV – MG 19.770

PROPIETARIO Y FABRICANTE:

Inata Produtos Biológicos Ltda.
Rodovia BR 365, Km 615, S/N° Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:

B.DOPHARMA DOMINICANA, S.R.L
Dirección en Carretera Duarte n°136-B
Licey al Medio - Santiago de los
Caballeros, Republica Dominicana
Telf.: (809) 580 9707