



ESPECIFICAÇÕES

BULA VACINA VIVA RINOVAC INATA:
BULA EM PAPEL SULFITE 70G, 1X1 COR
(PRETO), MEDINDO 100MM x 115MM





VIVA



LEIA COM ATENÇÃO

RINOVAC INATA®

Vacina viva liofilizada contra a Pneumovirose Aviária contendo Metapneumovírus Tipo B atenuado.



USO VETERINÁRIO

1.000 doses

INDICAÇÃO

RINOVAC INATA® é indicada para a proteção de galinhas reprodutoras, poedeiras e frangos de corte (espécie *Gallus gallus domesticus*) contra os efeitos causados pela Metapneumovirose Aviária (Síndrome da Cabeça Inchada). Possui em sua composição cepa de metapneumovírus aviário atenuado do tipo B produzida em cultivo de células Vero.

COMPOSIÇÃO

Cada dose do produto contém suspensão de Metapneumovírus aviário tipo B com título mínimo na data da liberação de $10^{2,2}$ DICT₅₀ e título mínimo na data do vencimento de $10^{1,6}$ DICT₅₀.

APRESENTAÇÃO

O produto é apresentado em frascos contendo 1.000 doses acondicionados em cartucho com 10 frascos e acompanhados de bula. Os diluentes para vacinação não acompanham o produto, sendo fornecidos sob solicitação.

DOSAGEM

A dosagem é de 1 gota/ave, equivalente a aproximadamente 0,03 mL, por via oral, devendo ser administrada diretamente no bico das aves.

MODE DE USAR

Administração via oral:

- Indicada para vacinação de aves com 7 dias de idade.
- Ressusender a vacina no Diluente para vacinação ocular INATA®, na proporção de 1 frasco de 1.000 doses para cada 30 mL de diluente (0,03 mL/ave).
- Agitar a suspensão até a sua completa dissolução.
- Transferir pequenas quantidades da suspensão para o frasco conta-gotas e proceder com a administração via oral.
- Manter a suspensão refrigerada durante todo o procedimento.





PRECAUÇÕES

1. Temperatura de estocagem: a vacina deverá ser estocada em temperatura entre 2°C e 8°C para que sejam preservadas as suas características durante todo o período de validade.
2. Após reconstituição e vacinação, qualquer sobra de vacina deve ser imediatamente descartada de forma adequada.
3. Não vacinar as aves nos 21 dias que antecedem o abate.
4. Não utilizar esta vacina 12 semanas antes de começar a postura e durante o período de produção das reprodutoras.
5. Não vacinar aves doentes ou desnutridas.
6. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
7. Descartar os frascos de vacina e de diluente utilizados conforme instruções regulamentares vigentes.
8. Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante desta vacina, visto que todas as provas de controle de qualidade foram realizadas com diluente próprio.
9. Mantenha um registro das vacinas e diluentes utilizados.

CONTRAINDICAÇÕES

Não há contraindicações se a vacina for administrada de acordo com as instruções de uso.

VALIDADE: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação.

Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C e ao abrigo da luz solar direta.

VENDA FRACIONADA PROIBIDA

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.537/2022 em 29/11/2022
Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco – CRMV-MG nº 19.770



PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.

Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180

CNPJ: 39.978.746/0001-00

SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

