



ESPECIFICAÇÕES

BULA VACINA VIVA PULMOVAC B1 INATA:
BULA EM PAPEL SULFITE 70G, 1X1 COR
(PRETO), MEDINDO 100MM x 115MM





LEIA COM ATENÇÃO

PULMOVAC B1®

Vacina viva Liofilizada contra Doença de Newcastle Contendo (Cepa HB1)



USO VETERINÁRIO

1.000, 2.000, 5.000, 10.000 doses

INDICAÇÃO

PULMOVAC B1 INATA® é indicada para a proteção de galinhas reprodutoras, poedeiras e frangos de corte contra a Doença de Newcastle. Possui em sua composição cepa HB1 produzida em ovos SPF (Specific Pathogens Free).

COMPOSIÇÃO

Cada dose do produto contém suspensão de vírus da Doença de Newcastle cepa HB1 com título mínimo na data da liberação de $10^{6.2} \text{DIE}_{50}$ e título mínimo na data do vencimento de $10^{5.5} \text{DIE}_{50}$.

APRESENTAÇÃO

O produto é apresentado em frascos contendo 1.000, 2.000, 5.000 ou 10.000 doses, acondicionados em cartuchos com 10 frascos, acompanhados de bula. O diluente para vacinação ocular não acompanha o produto, sendo fornecido sob solicitação.

DOSAGEM

A dosagem é de 1 dose/ave, equivalente a 0,03 mL, por meio da via ocular.

MODE DE USAR

- Indicada para vacinação de aves a partir de 7 dias de idade.
- Ressuspender a vacina no Diluente para vacinação ocular INATA®, na proporção de 1 frasco de 1.000 doses para cada 30 mL de diluente (0,03 mL/ave).
- Agitar a suspensão até a sua completa dissolução.
- Transferir pequenas quantidades da suspensão para o frasco conta-gotas e proceder com a administração ocular.
- Manter a suspensão refrigerada durante todo o procedimento.
- Desde que a vacina seja aplicada corretamente, 3 semanas após a administração, se espera que os animais estejam imunizados contra a doença de Newcastle. Essa imunidade deve permanecer até as 6 semanas de vida dos animais (ou seja, cinco semanas após a aplicação da vacina).

VALIDADE

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação.





PRECAUÇÕES

- 1.Temperatura de estocagem: o produto deverá ser estocado em temperatura entre 2°C e 8°C para que sejam preservadas as suas características durante todo o período de validade.
- 2.Ésta vacina é constituída de vírus vivo e fechada à vácuo. Portanto, recomenda-se utilizar a vacina em até 90 minutos após ressuspensida, de modo a evitar a perda da capacidade imunogênica da mesma.
- 3.Após reconstituição e vacinação, qualquer sobra deve ser devidamente descartada.
- 4.Não vacinar aves nos 21 dias que antecedem o abate.
- 5.Não utilizar esta vacina 12 semanas antes de começar a postura e durante o período de produção das reprodutoras.
- 6.Não vacinar aves doentes ou desnutridas.
- 7.Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- 8.Descartar os frascos de vacinas utilizados conforme instruções regulamentares vigentes.
- 9.Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante desta vacina, visto que todas as provas de controle de qualidade foram realizadas com diluente próprio.
- 10.Mantenha um registro das vacinas e diluentes utilizados.

CONTRAINDICAÇÕES

Não há contraindicações se a vacina for administrada de acordo com as instruções de uso.

Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C e ao abrigo da luz solar direta.

VENDA FRACIONADA PROIBIDA

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.462/2021 em 31/12/2021.

Resp. Técnico: José Renato de Oliveira Branco - CRMV-MG nº 19.770



PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



Inata Produtos Biológicos Ltda.

Rodovia BR 365, Km 615, S/Nº Bloco D.
Uberlândia - MG. CEP: 38.407-180
CNPJ: 39.978.746/0001-00
SAC: (34) 3222-5700 / sac@inata.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

